

13 Rodziny z nowymi matkami w porównaniu do rodzin, w których były obecne stare matki przezimowały:

- a) lepiej b) tak samo c) gorzej d) nie wiem

14 W ilu ulach rodzin, które przeżyły obecne były ślady silnej biegunki (znaczne ilości kału)?

15 W sezonie 2020 transportowałam/em przynajmniej raz rodziny na pożyczki w celu produkcji miodu

lub świadczenia usług zapylania a) tak b) nie c) nie wiem

16 Średnio, jaki procent plastrów wymienił/a Pan/i w rodzinie w 2020 r.?

- a) 0% b) 1-30% c) 31-50% d) więcej niż 50%

17 Czy wymienione pożyczki w 2020 r. były wykorzystywane przez większość Pana/i rodzin?

- | | | | |
|------------|--------|--------|-------------|
| sady | a) tak | b) nie | c) nie wiem |
| rzepak | a) tak | b) nie | c) nie wiem |
| kukurydza | a) tak | b) nie | c) nie wiem |
| słonecznik | a) tak | b) nie | c) nie wiem |
| wrzos | a) tak | b) nie | c) nie wiem |
| nawłóć | a) tak | b) nie | c) nie wiem |
| spadź | a) tak | b) nie | c) nie wiem |

18 Czy w okresie kwiecień 2020 - marzec 2021 badał/a Pan/i stopień porażenia warrozą w swoich rodzinach pszczelich?

- a) tak b) nie c) nie dotyczy

19 Czy w okresie kwiecień 2020 - marzec 2021 zwalczał/a Pan/i warrozę w swoich rodzinach pszczelich?

- a) tak b) nie c) nie wiem/nie dotyczy

20 Proszę zaznaczyć w jakich miesiącach (w okresie kwiecień 2020 - marzec 2021) monitorował/a Pan/i stopień porażenia rodzin warrozą i wskazać kiedy rozpoczął/ęła konkretny zabieg przeciwwarrozowy w rodzinach produkcyjnych Metoda/Produkt	Miesiąc, w którym dane zabiegi lecznicze rozpoczęto:											
	2020								2021			
	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec
Badanie stopnia porażenia przez <i>Varroa destructor</i>												
Wycinanie czerwiu trutowego												
Hipertermia (stosowanie wysokiej temperatury)												
Inna metoda biotechniczna (np. plastry pułapki, całkowite usuwanie czerwiu, izolowanie matki)												
Kwas mrówkowy – krótkoterminowo (do 3 dni)												
Kwas mrówkowy – długoterminowo												
Kwas szczawiowy – nakrapianie (Oxybee, Varromed)												
Kwas szczawiowy – sublimacja (odparowanie)												
Kwas szczawiowy – w formie pasków												
Tymol (np. Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)												
Flumetryna (np. Bayvarol, PolyVar Yellow)												
Amitraz w paskach (Biowar, Apivar)												
Ile pasków na ul wprowadzono i jak długo w ulu pozostawały?												
Amitraz – tabletki do odymiania (Apiwarol)												
Ile razy i w jakich odstępach przeprowadzono odymianie?												
Inny produkt chemiczny (.....)												
Inna metoda (.....)												

21 Jeżeli w pasiece w sezonie 2020 wystąpiły objawy nasuwające podejrzenie ostrego zatrucia pszczoł (nagle pojawienie się przed wylotkami większości uli dużej liczby martwych lub porażonych pszczoł) to w jakim to było miesiącu/miesiącach?

Nie wiem

22 Czy w trakcie sezonu pszczelarskiego 2020/2021 zauważył/a Pan/Pani pszczoły ze zdeformowanymi skrzydłami? (objaw obecny przy wirusie zdeformowanych skrzydeł, który rozprzestrzenia się przez warrozę)

- a) nie b) u pojedynczych osobników c) u wielu osobników d) nie wiem